

Description d'un nouveau Baeine [HYM.]

par J.-J. KIEFFER.

Ceratobaeus lucifugax, n. sp. — ♀. Noir; antennes sauf la massue, hanches, pattes et pétiole d'un jaune roux, abdomen d'un roux marron, la proéminence ou corne du pétiole est noire. Tête et thorax mats et chagrinés, tête plus large que le thorax, yeux pubescents. Ailes subhyalines, un peu plus courtes que l'abdomen, nervure marginale épaissie et plus petite que la stigmatique qui est oblique et noueuse au bout, postmarginale aussi longue que la marginale. Abdomen graduellement aminci, d'un tiers plus long que le reste du corps. deux premiers tergites striés sauf la corne qui est lisse; 3^e tergite le plus large et le plus long, chagriné comme les suivants qui décroissent graduellement. Quant au reste, semblable à *Ceratobaeus cornutus* Ashm. — Taille : 4,5 mill.

Environs de Trieste, capturé par le D^r GRAEFFE. en tamisant la mousse.

Description de trois nouvelles espèces de *Timora* [LEP. NOCTUIDAE] provenant de la Haute-Guinée française (1)

par J. DE JOANNIS.

Timora perrosea, n. sp. — Exp. al. : 18 mill. — *Anticis luteo-griseis, cum vitta longitudinali, triangulari, laete rosea, ab origine medianae ad marginem externum, secundum quem extenditur fere ad apicem, dum, ex ima parte, terminatur mediana et vena 2; haec vitta aliquot punctis albis signatur. Ciliis ad basim albis, postea griseis. Posticis albidis, ciliis leviter nigro signatis ad finem venarum. Infra, anticis luteo-griseis pallidis, paululum infuscatiss in medio; posticis ut supra.*

(1) Je dois ces espèces, et quelques autres dont j'aurai occasion de parler, à l'amabilité d'un de mes neveux, L. DE JOANNIS, qui les a recueillies dans la région de Siguri (Haute-Guinée) tandis qu'il y faisait partie de la mission de Koba-Balato en 1908.

Sir G.-F. HAMPSON a eu l'obligeance d'examiner ces trois espèces et m'a dit qu'elles étaient encore inédites.